




## آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی



۱۳۹۴

تهیه کننده: دکتر شهرام صفری (متخصص داخلی)


## آمادگی های لازم قبل از انجام آندوسکوپی:

قبل از انجام آندوسکوپی، معده باید کاملا خالی باشد. بیمار به مدت ۸ ساعت نباید چیزی بخورد یا بیاشامد. بیمار باید مصرف هرگونه دارو را به اطلاع پزشک برساند و از لزوم مصرف یا عدم مصرف آن آگاه شود. بیمارانی که مشکل دریچه ای قلبی دارند و لازم است قبل از اقدامات دندانپزشکی آنتی بیوتیک مصرف کنند، حتما باید این موضوع را به اطلاع پزشک برسانند. چون ممکن است قبل از انجام آندوسکوپی نیز مصرف آنتی بیوتیک لازم باشد.

اگر بیماری خاصی مثل بیماری قلبی، ریوی و ... دارید حتما پزشک خود را مطلع کنید. چون ممکن است ملاحظات خاصی لازم باشد.

قبل از انجام آندوسکوپی، برای راحتیتر بودن بیمار مقداری آرامبخش به بیمار تزریق میگردد. به همین علت پس از انجام آندوسکوپی تنها قادر به رانندگی نخواهد بود. بنابراین داشتن همراه کمک کننده است.


آندوسکوپ از داخل مری، معده و دوازدهه می گذرد و پزشک می تواند با دقت این قسمتها را ببیند. به وسیله ی آندوسکوپ هوا به داخل معده وارد می شود این باعث باز شدن لایه های معده شده تا قسمت های مختلف آن بهتر دیده شود. پزشک می تواند بافت های غیر طبیعی التهابی و خونریزی که به وسیله ی عکس رادیولوژی خوب دیده نمی شود را ببیند. پزشک همچنین می تواند وسایلی برای گرفتن نمونه و کنترل خونریزی از داخل آندوسکوپ عبور دهد.



hiDoctor.ir

## آندوسکوپی چیست؟

آندوسکوپ یک لوله ی باریک و انعطاف پذیر با دوربینی بر یک سر آن است. برخی از انواع آندوسکوپی نیاز به آمادگی های مخصوص مثلا پاک کردن معده یا روده دارد. لذا پزشک از بیمار می خواهد که پیش از انجام عمل چیزی نخورد یا ننوشد، یا مسهل تجویز کند.



**آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش:** برای آندوسکوپی قسمت ابتدایی دستگاه گوارش، لوله انعطاف پذیری از راه دهان به داخل مری، معده و دوازدهه (اولین قسمت روده ی کوچک) فرستاده می شود تا این قسمت ها بررسی و بیماریهایی مثل زخم مشخص شوند. ممکن است گلو با اسپری بی حس کننده موضعی بیحس شود یا این که داروی خواب آور ضعیفی برای فرد تجویز شود. آندوسکوپی معمولا حدود ۱۵ دقیقه طول می کشد. می توان موقع، آندوسکوپی نمونه هایی را هم برای بررسی و تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه از دستگاه گوارش برداشت.

## موارد استفاده از آندوسکوپی فوقانی:

در جریان آندوسکوپی بر حسب شرایط مثلا پیدا شدن ضایعات غیر طبیعی از آن ضایعات نمونه برداری (بیوپسی) هم بعمل می آید و یا گاهی اقدامات تشخیصی و یا در مانی دیگر انجام می شود.

### مهمترین موارد جهت انجام آندوسکوپی شامل:

تهوع و استفراغ مداوم- درد در ناحیه ی فوقانی شکم. (محدوده ی بالاتر از ناف)- سوزش سر دل که ناشی از برگشت اسید معده به مری می باشد و با احساس سوزش در گلو یا قفسه ی سینه مشخص می شود- خونریزی معده (وجود استفراغ خونی یا وجود خون در مدفوع به صورت دفع مدفوع سیاه و قیری)- وجود یافته های غیر طبیعی و یا مشکوک در عکس در رادیوگرافی- اشکال در بلع (گیر کردن غذای جامد یا مایعات در مری)- خارج کردن جسم خارجی از دستگاه گوارش- برای بررسی ضایعات قبلی و پیگیری آنها از نظر روند بهبودی و گسترش آنها مثل پولیپ، تومور یا زخم

## نحوه ی انجام آندوسکوپی:

برای این پروسیجر شما باید تیوی نازک، منعطف و پر نور را بلعید که به آن آندوسکوپ گفته می شود. درست قبل از انجام این پروسیجر پزشک داخلی گلو ی شما را با مواد بی حس کننده ای برای جلوگیری از عق زدن بی حس می کند. ممکن است برای کمتر شدن درد و شل شدن عضلات به شما داروی آرام بخش در طول معاینه و انجام آندوسکوپی داده شود. در حین انجام این عمل بیمار به پهلو ی چپ خوابیده (معمولا) و آب دهان و ترشحات گلو ی خود را بیرون می ریزد و باید از قورت دادن آب دهان اجتناب کند.

