

آموزش:

- ۱- از فعالیتهایی که موجب درد سینه و تنگی نفس و خستگی می‌شود خودداری کنید و بین کار و فعالیت به استراحت پردازید.
- ۲- از مواجهه با هوای خیلی گرم یا سرد پرهیزید.
- ۳- رژیم کم نمک و کم چرب را رعایت کنید و چای و قهوه کم مصرف کنید.
- ۴- از عصبانیت و استرس روحی اجتناب کنید.
- ۵- از مصرف سیگار و مشروبات الکلی خودداری کنید.
- ۶- داروهای خود را در ظرفی که دارای برچسب مخصوص حاوی نام دارو و زمان مصرف باشد نگهداری کنید.
- ۷- همیشه قرص نیتروگلیسیرین را هر ۵ دقیقه باشید و در صورت احساس درد هر ۵ تا ۱۰ دقیقه یک عدد استفاده کنید.

۸- وزن خود را در حالت ایده ال نگه دارید.

۹- هنگام حمام کردن از دوش گرفتن از آب بسیار گرم یا سرد پرهیزید.

برنامه مواد غذایی:

مجاز:

سبزیجات - میوه‌ها - لبнیات کم چرب - گوشت سفید - ماهی و مرغ

رژیم غذایی محدود شونده:

کله پاچه - سیرابی - گوشت قرمز - سرخ کردنی - خامه - کره - روغن جامد - خیارشور - کالباس و تخم مرغ

مادر سلامتی، ورزش و تحرک است



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
معاونت امور دانشجویان

شبکه بهداشت و درمان نقده

بیمارستان امام(ره) نقده

CHEST PAIN

یا

درد قلبی

واحد آموزش

منبع: بروفر سودارت

سال ۱۳۹۳

تعريف:

درد یا احساس فشار مبهم در زیر استرnum (جناغ سینه) که اغلب به فک بازوی چپ و شانه ها انتشار میابد.

ظاهرات بالینی:

درد سینه ممکن است همراه با تهوع و استفراغ و تعریق باشد

علیم بیش از ۲۰ دقیقه طول کشیده و بهبود نمیابد

تنگی نفس احساس سبکی در سر از دست دادن هوشیاری و فشار خون پایین

تشخیص:

ویژگیهای درد: (گنگ - شدید فشاری - سوزشی تیر)

عوامل تشدید کننده: (فعالیت - تنفس عمیق - به پشت خوابیدن - لمس)

درمان:

علل قلبی نیاز به درمان فوری و تهاجمی دارد.

ریسک فکتورها:

سابقه خانوادگی و عالیم همراه تعریق سبکی

سر تهوع و استفراغ و تنگی نفس

سن بالا - مصرف قباکو - سیگار هیپر لیپیدمی -

دیابت شیرین فشار خون بالا - سطح بالای

هوموسیستئین و جنس مذکر

EKG ممکن است نشان دهنده ایسکمی یا آریتمی

باشد

در MI ممکن است آنژیمهای قلبی بالا رفته باشد

- ✓ تجویز نیتراتها و مرفین جهت تسکین درد - آسپرین ۱۶۰ تا ۳۲۵ میلی گرم - در صورت حساسیت به آسپرین از دیپریدامول استفاده می شود.

- ✓ اکسیژن تراپی (SPO₂ بالای ۹۲ درصد حفظ شود)

- ✓ تزریق هپارین و بتا بلوکرهای میزان مرگ و میر را کاهش می دهد

توجه: از تجویز بتا بلوکرهای در فشار خون پایین و برآیدکاری خودداری شود.