



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه معاونت امور درمان

بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) نقده



مراقبتهای دوران نوزادی

زردی نوزادی:

بیماری شایع و اکثرا خوش خیم دوره نوزادی است که در روز دوم یا سوم زندگی شروع و تا روز دهم برطرف می‌شود. علت آن وجود رنگ دانه ایی بنام بیلی روین در خون و بافت‌های نوزاد است. این بیماری واگیردار نیست. بروز و یا شدت آن ارتباطی یا رژیم غذایی یا عفونت هپاتیت ندارد.

چرا نوزادان زردی می‌گیرند؟

علت بروز زردی، معمولاً تغییراتی است که در چند روز اول زندگی، برای سازگاری جنین با زندگی خارج رحمی اتفاق می‌افتد. زردی نوزاد معمولاً خود به خود برطرف می‌شود. ولی عدم درمان آن اگر از حد مشخصی که برای هر نوزاد مقدارش متفاوت است بالاتر رود و یا اگر به دلیل یک بیماری زمینه ایی باشد: می‌تواند باعث ایجاد آسیب مغزی در نوزاد شود.

توصیه‌های لازم در مورد زردی نوزادان:

- افزایش تعداد دفعات شیردهی باعث تحریک پستان‌ها و تولید شیر بیشتر می‌شود و این می‌تواند منجر به دفعات بیشتر اجابت مزاج در شیر خوار شود و این عامل به پایین نکه داشتن میزان بیلی روین کمک می‌کند.
- در صورت زردی شدید با توجه به توصیه پزشک نوزاد را زیر نور آبی قرار دهید (نور درمانی) از نورخورشید برای درمان زردی استفاده نکنید.
- در موقع نور درمانی چشم و آلت تناسلی نوزاد را بپوشانید
- دادن آب و آب قند کمکی به کاهش زردی نمی‌کند

مراقبت از بند ناف:

پس از زایمان نوزاد روى بند ناف گيره زده شده و بريده ميشود. بخش کوچک بند ناف که روی شکم نوزاد باقی می‌ماند کم خشک ميشود و می‌افتد و ناف را ببروی شکم بر جا می‌گذارد. معمولاً بند ناف ۳ تا ۷ روز بعد از تولد می‌افتد.

توصیه‌های لازم برای مراقبت از بند ناف:

- بند ناف را خشک و تمیز نگه دارید و از الكل استفاده نکنید مگر به دستور پزشک.
- شکم یا ناف را بانداز نکنید.
- بند ناف را از بالای پوشک بچه دور نگه دارید زیرا ممکن است بند ناف زودتر کنده شده و خونریزی کند.
- بند ناف را با پوشک نپوشانید اگر بند ناف در معرض هوا باشد خشک می‌ماند. کمی ترشح مایع طبیعی است.

- وجود بند ناف مانع برای استحمام نوزاد نیست .
- در صورت داشتن خونریزی از محل بند ناف ، متورم و قرمز شدن پوست اطراف بند ناف ، ترشح چرکی زیاد ، ترشح بوی بد و نا مطبوع و نیفتادن بند ناف تا روز دهم حتما به پزشک کودکان مراجعه نمایید .

استحمام نوزاد :

تبخیر مایع سطح بدن نوزاد سبب دفع گرمای بدن نوزاد میشود بنابراین در ۲۴ ساعت اول عمر با توجه به پایین آمدن دمای بدن نوزاد استحمام با دقت انجام شود . دمای اتاق بین ۲۸-۲۵ درجه سانتی گراد باشد واژ یک گرم کننده تابشی استفاده شود . استحمام بوسیله پنبه و آب گرم صورت گیرد .



توصیه های کلی برای مراقبت از نوزاد :

- نوزاد را به شکم نخوابانید بهتر است نوزاد را به پهلو یا پشت بخوابانید .
- از هیچ ماده های مانند سرمه و یا هیچ دارویی برای چشم بدون تجویز پزشک استفاده نکنید .
- هر گز نباید پستان نوزاد را فشار دهید واژ دستکاری انها اجتناب کنید زیزا میتواند باعث عفونت جدی شود .
- ممکن است نوزادان دختر ترشحات سفید یا مختصراً خونی از مجرای تناسلی داشته باشند که به علت هورمونهای مادر حین حاملگی است .
- در صورت نداشتن ادرار تا ۲۴ ساعت و مدفوع تا ۴۸ ساعت پس از تولد به پزشک مراجعه شود .
- ختنه نوزادان پسر در ماه اول و ترجیحا از ۶ ساعت پس از تولد و پس از اولین معاینه نوزاد تا بیش از ترخیص از بیمارستان حداکثر تا پایان دوره نوزادی (۲۸ روز اول زندگی) توسط پزشک انجام شود
- در روزهای ۳تا ۵ پس از زایمان برای دریافت مراقبت نوبت دوم نوزاد به مراکز بهداشتی مراجعه کنید در این زمان خون پاشنه پای نوزاد به منظور کنترل هیپو تیروئیدی و فنیل کتونوری گرفته میشود .

علایم خطر نوزادی :

زردی ۲۴ ساعت اول - توکشیده شدن قفسه سینه - ناله کردن - رنگ پریدگی شدید یا کبودی - استفراغ مکرر شیر - قرمزی اطراف چشم - تحرک کمتر از حد معمول و بیحالی - بیقراری و تحریک پذیری - ترشحات چرکی ناف یا قرمزی اطراف ناف - خوب شیر نخوردن - عدم دفع مدفوع وادرار در روزهای اول - جوش های چرکی منشر در پوست - تب یا سرد شدن اندامها و بدن - خروج ترشحات چرکی از چشم و تورم پلکها

مددجویان محترم در

صورت داشتن هرگونه

سوال و یا مشکل با شماره

تلفن ۳۵۶۳۳۸۴۴ (بخش

زایمان) تماس حاصل

فرمایید .

منبع : بسته خدمتی نوزاد سالم - راهنمای خود مراقبتی خانواده

