




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان

بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده

برونشیولیت

ویژه والدین



واحد آموزش سلامت-بهار ۱۴۰۴

تاییدکننده: کارگروه آموزش به بیمار بخش اطفال

کدسند: EH-MN/Pat Edu Pam/۰۰۰۰۱

این پمفلت به عنوان راهنمای آموزشی والدین می باشد. واحد آموزش سلامت تلاش می کند اطلاعات دقیق و به روز در اختیار بیمار و خانواده قرار دهد. اگر شما اطلاعات بیشتری نیاز دارید حتما با پزشک کودک مشورت کنید.


منبع:

درسنامه پرستاری کودکان

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات

شماره تماس: ۰۴۴۳۵۶۶۱۸۲۰

شماره داخلی: ۱۴۴۶



جهت دریافت
فایل می توانید
بارکد را با تلفن
همراه خود اسکن
نمایید

- اگر هوای اتاق کودک خشک باشد، می توانید با استفاده از دستگاه بخور سرد، هوا را مرطوب کنید و به کاهش خلط و سرفه کودک کمک کنید.
- دستگاه بخور آب را به صورت بخار در هوا پخش می کند با تنفس بخار گرفتگی بینی کودک برطرف می شود. دستگاه بخور را به خوبی تمیز کنید تا از رشد باکتری ها و قارچ ها جلوگیری شود.
- اگر تب دارد می توانید استامینوفن بدهید.
- به فرزندتان آسپیرین ندهید آسپیرین برای کودکان کمتر از ۱۸ سال خطرناک است. مگر اینکه پزشک با توجه به بیماری کودک تجویز کند.

توجه:

اگر یکی از علامت های زیر را دیدید کودک را بلافاصله به پزشک ببرید:

- کودک شما به سختی نفس می کشد یا نفسهایش صدادر است.
- سریع تر از قبل نفس می کشد.
- بی قرار است.
- لب و انگشتانش کبود شده اند.
- بی اشتهاست یا به سختی غذا می خورد.
- ادرارش کمتر شده است.

برونشیولیت چیست؟

برونشیولیت از بیماریهای عفونی ریه است که باعث می شود لوله های تنفسی کوچک ریه یعنی برونشیول ها دچار التهاب شوند. التهاب این لوله ها جریان هوا در ریه ها مسدود می کند و تنفس دچار مشکل می شود. بیشتر در یکسال اول زندگی و در شیرخواران ۳ تا ۶ ماه دیده می شود.

علت برونشیولیت چیست ؟

ویروسهای مختلفی می توانند باعث برونشیولیت شوند. همچنین وقتی فرد بیماری با کودک شما تماس پیدا میکند کودک را مبتلا می کند. وقتی یک بیمار تنفسی سرفه یا عطسه می کند. ویروسها در هوا پخش شده و می توانند از طریق هوا به کودک شما منتقل شوند.

علامت های برونشیولیت چیست ؟

معمولا با علائم سرماخوردگی شروع میشود.

- سرفه های مداوم
- تنفس مشکل همراه با فرورفتن عضلات ناحیه گردن و قفسه سینه
- آب ریزش بینی
- تب
- کاهش اشتها یا کاهش فعالیت

چه کودکانی بیشتر برونشیولیت می گیرند؟

- نوزادان و نوزادان نارس که قبل از ۳۲ هفته به دنیا آمده اند.
- کودکانی که بیماری قلبی و یا بیماری ریوی دارند.

• کودکان کمتر از ۱ سال

- کودکان در معرض دود سیگار
- کودکانی که از پستان مادر تغذیه نمی شوند.
- کودکانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند.
- بیماری عصبی عضلانی دارند مثل فلج مغزی
- ویروس ها چگونه پخش می شوند؟

ویروس ها به راحتی از طریق وسایل آلوده ، بوسیدن فردی که سرماخوردگی دارد یا دستهایی که شسته نشده اند منتقل می شوند.

چگونه می توانیم از این عفونت پیشگیری کنیم ؟

- رعایت بهداشت دست بهترین روش پیشگیری است.
- کودک خود را از افراد بیمار دور نگهدارید.
- همه اعضا خانواده را تشویق کنید دست های خود را مرتب بشویند.
- سطوح و دستگیره درها را مرتب تمیز کنید.
- اطراف فرزندان سیگار نکشید و فرزندان را از افرادی که سیگار می کشند دور نگه دارید.
- هنگامی که سرفه یا عطسه می کنید دهان و بینی خود را بپوشانید و به کودک نیز یاد بدهید.

چگونه تشخیص داده می شود ؟

با توجه به علائم بالینی و معاینه توسط پزشک تشخیص داده می شود. ممکن است آزمایش خون ، تصویر برداری از قفسه سینه انجام شود.

چگونه درمان می شود؟

درمان انجام اقدامات حمایتی است معمولا ۱ تا ۲ هفته طول می کشد تا علائم بیماری برطرف شود. علائم در بیشتر کودکان بعد از ۳ یا ۴ روز بهتر می شود. در صورت علائم شدید نیاز به بستری دارد.

چگونه از فرزند مبتلا به برونشیولیت مراقبت کنم ؟

- برای اینکه ترشحات بینی نرم شده و راحت تر خارج شوند از قطره بینی سدیم کلراید استفاده کنید.
- از قطرات بینی دیگری استفاده نکنید مگر اینکه پزشک گفته باشد.
- اگر فرزند شما کمتر از ۶ ماه سن دارد می توانید بعد از ریختن قطره بینی ترشحات را بایک پوار تخلیه کنید.

چگونه از پوار استفاده کنیم؟

اول قسمت تویی را فشار دهید و در این حالت به آرامی سوراخ بینی کنید بعد فشار روی توپ را بردارید تا ترشحات بینی به داخل پوار کشیده شوند. پوار ها معملا یک بار مصرف هستند ولی اگر یکبار مصرف نیست وقطعات آن از هم جدا می شود بعد از هر بار استفاده آنها را جدا کنید و بشویید.

