




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان

بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده

سنگ شکنی از طریق حالب


ویژه بیماران و همراهان



واحد آموزش سلامت - بهار ۱۴۰۴

تاییدکننده: کارگروه آموزش به بیمار بخش جراحی

کدسند: EH-MN/Pat Edu Pam/۰۰۰۰۱



منبع:

برونر سودارث

<https://www.clinicalkey>.

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات

شماره تماس: ۰۴۴۳۵۶۶۱۸۲۰

شماره داخلی: ۱۴۴۶



پس از ترخیص از بیمارستان:

- داروی آنتی بیوتیک را که برای جلوگیری از عفونت تجویز میشود تا پایان استفاده کنید. وجود درد مختصر پهلوی و سوزش ادرار خفیف و خونی بودن ادرار پس از عمل طبیعی است ولی اگر درد شدید بود میتوانید از مسکن های خوراکی استفاده نمایید.
- از روز بعد عمل می توانید استحمام کنید.
- فعالیت عادی خود را از سر بگیرید.
- از روز بعد عمل، راه رفتن در حد معمول برای کمک به دفع سنگ ها کافی است.
- دویدن بیش از حد، بالا و پایین پریدن و طناب زدن و فعالیت های ورزشی شدید کمکی به دفع بیشتر سنگ نمیکند.
- فعالیت جنسی از روز بعد عمل بلامانع است.
- بهتر است مصرف مایعات را اندکی افزایش دهید.
- در صورتی که قطعات درشت سنگ را در ادرار مشاهده کردید و توانستید آن ها را جمع آوری کنید می توان با آزمایش آنها جنس سنگ را مشخص کرده و رژیم غذایی دقیق تری برای شما تعیین کرد.
- در صورتی که استنت دبل جی در حالب شما گذاشته شده است، تا زمانی که استنت وجود دارد سوزش ادرار، درد گاه به گاه پهلوی، تکرر ادرار و خونی شدن ادرار وجود خواهد داشت و نباید شما را نگران کند.
- در صورتی که استنت دبل جی در حالب شما گذاشته شده است، حتما بعد از یک ماه جهت خروج آن به پزشک خود مراجعه نمایید.
- در صورت خونریزی زیاد و وجود خون غلیظ در ادرار به پزشک خود مراجعه نمایید.

مددجوی عزیز:

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما، امیدواریم از لحظاتی که در کنار شما بودیم رضایت کافی داشته باشید و هر چه سریعتر به آغوش خانواده و جامعه بازگردید. این پمفلت آموزشی جهت افزایش اطلاعات شما در مورد مراقبت بعد از عمل و پیشگیری از عوارض آن در اختیار شما قرار گرفته است.

حالب لوله ای است که ادرار را از کلیه به مثانه منتقل می کند. تا زمانی که سنگ در کلیه است معمولا درد چندانی ایجاد نمی شود ولی وقتی سنگ از کلیه خارج شده و وارد لوله حالب شود معمولا درد بسیار شدیدی در پهلوی همان طرف ایجاد می شود که به آن کولیک کلیوی گفته می شود. این درد اغلب متناوب و همراه با تهوع و استفراغ است.

اگر اندازه سنگ کوچک باشد (کمتر از ۵ میلی متر) ممکن است با درمان دارویی و صبر کردن سنگ دفع گردد ولی اگر سنگ حالب بزرگ باشد و پس از ۲ هفته انتظار و درمان دارویی دفع نشود معمولا سنگ شکنی لازم است چون باقیمانده سنگ در حالب به مدت طولانی وانسداد مسیر حالب باعث از کار افتادن کلیه همان طرف خواهد شد.

سنگ های ابتدای حالب را ممکن است بتوان با سنگ شکنی از روی بدن شکست که نیاز به بیهوشی و اتاق عمل ندارد و روش سرپایی می باشد.

ولی سنگ های قسمت میانی و تحتانی را با سنگ شکنی از راه مجرا خرد می کنند که در اتاق عمل انجام شده و نیاز به بیهوشی دارد.


همانطور که گفته شد TUL در اتاق عمل و با بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی از کمر به پایین انجام می شود. بنابراین بیمار باید قبل از عمل ناشتا باشد. در TUL هیچ برشی روی بدن ایجاد نمی شود و تمام اقدامات از طریق مجرای ادراری انجام می شود.

در این روش جراح با وسیله ای به نام یورتروسکوپ که قطر آن ۴ تا ۶ میلی متر دارد، وارد حالب می شود و به سمت کلیه بالا می رود تا به سنگ برسد.

پس از مشاهده سنگ با پروپ بسیار ظریفی که وارد دستگاه می شود، ضربات بسیار سریع و پر قدرتی به سنگ وارد می شود تا سنگ خرد شود.

اگر حالب گشاد باشد شاید بتوان با پنس قطعات سنگ را پس از سنگ شکنی از داخل حالب خارج کرد.

ولی معمولا نیازی به این کار نیست و خرده های سنگ به حال خود رها شده تا با جریان ادرار خارج شوند.



استنت حالب چیست ؟

اگر قطعات سنگ بسیار درشت یا زیاد باشند یا حالب ظریف و تنگ و یا متورم شده باشد، برای اینکه راه کلیه باز بماند و قطعات سنگ راحت تر دفع شوند جراح لوله ای به نام استنت حالب (استنت دبل جی) را در حالب قرار می دهد. یک سر این استنت در کلیه و سر دیگر آن در مثانه قرار می گیرد.

این استنت موقتی است و باید حداکثر تا یک ماه بعد خارج شود. البته انواع ماندگارتر آن موجود است که در موارد خاصی استفاده می شود و می توانند تا چند ماه در حالب باقی گذاشته شوند.

پس از خروج از اتاق عمل

چنانچه برای TUL از بی حسی نخاعی استفاده شده باشد دو ساعت بعد از خروج از اتاق عمل و اگر از بیهوشی عمومی استفاده شده باشد، پس از هوشیاری کامل میتوان مصرف مایعات را شروع کرد.

چنانچه مایعات را تحمل کرده و تهوع و استفراغ نداشته می توان غذاهای معمولی را شروع کرد. اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد، می توان عصر همانروز یا صبح روز بعد از عمل از بیمارستان ترخیص شود.

