




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آرم

بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده

آندوسکوپی

ویژه بیماران و همراهان



واحد آموزش سلامت

بهار 1404

تاییدکننده: کارگروه آموزش به بیمار بخش داخلی

و واحد آندوسکوپی

کد سند: EH-MN/Pat Edu Pam/00-07

منبع:

برونر سودارث

شماره تماس: 04435661820

شماره داخلی 1446

جهت دریافت

فایل می توانید

بارکد را با تلفن

همراه خود اسکن

نمایید

بعد انجام آندوسکوپی

- به علت دریافت آرامبخش تا 24 ساعت رانندگی نکنید.
- تا زمانی که اثر داروهایی که دریافت کرده اید ، فشار خون ، ضربان قلب ، تنفس و سطح اکسیژن خون شما بررسی می شود.
- زمانی که بی حسی گلوئی شما تمام می شود می توانید چیزی بخورید.
- از پرستار بخش و پزشک معالج در مورد این که چه زمانی جواب نمونه آماده است ، سوال بپرسید.
- پیگیری نمونه ی پاتولوژی را در تاریخ مشخص شده انجام دهید.

شما نیاز به مراقبت پزشکی دارید اگر:

- گلو درد بیش از یک روز طول بکشد.
- بلع مشکل داشتید.

شما نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارید در صورتی که علائم زیر را داشته باشید:

- بروز تب
- استفراغ خونی یا استفراغی که به نظر ت می رسد قهوه ای باشد.
- مدفوع خونی سیاه رنگ یا قیری رنگ
- گلو درد شدید یا نداشتن توان بلع غذا
- تنفس سخت

آندوسکوپي فوقانی آندوسکوپي فوقانی:

روشی است که از آن جهت مشاهده بخش فوقانی دستگاه گوارش استفاده میشود.

در این روش پزشک شما یک لوله ی باریک و قابل انعطاف را از دهانتان عبور می دهد و از مری به معده داخل میشود.

یک دوربین کوچک به انتهای لوله چسبیده است عکس ها با دوربین بر روی مانیتوری که در داخل اتاق آندوسکوپي نصب شده است نمایش داده می شود.

در طی انجام آندوسکوپي , پزشک ممکن است تکه هایی از بافت را جهت فرستادن به آزمایشگاه و بررسی میکروسکوپي بافت شما نمونه بردار و در ظرف مخصوص جهت ارسال به پاتولوژی قرار دهد.

خطرات و عوارض آندوسکوپي چیست؟

به طور کلی این روش بی خطر می باشد با این حال مشکلاتی ممکن است رخ دهد:

❖ واکنش حساسیتی به داروها

❖ سوراخ یا پارگی در مری , معده یا روده

❖ عفونت

❖ خونریزی

پزشک ممکن است جهت تشخیص سرطان بخش فوقانی دستگاه گوارش و همچنین جهت پیدا کردن علت مشکلات دیگر مانند :

• درد معده

• سوزش سر دل

• درد یا مشکل هنگام بلع

• تهوع و استفراغ

• خونریزی از معده

• زخم معده

آندوسکوپي را انجام دهد.

قبل از انجام آندوسکوپي شما باید موارد زیر را

بدانید و اطلاع دهید:

- هرگونه آلرژی با حساسیت به داروی خاص
- هر گونه دارویی که مصرف میکنید :
- شامل ویتامین ها , قطره های چشمی و یا هر دارویی که بدون نسخه پزشک استفاده می کنید و یا مصرف آسپرین یا وارفارین
- هر گونه اختلال خونی که دارید.
- هر گونه جراحی قبلی که داشتید.
- هر مشکل پزشکی قبلی
- بارداری

:

آمادگی قبل از انجام آندوسکوپي

- دستور پزشک مربوط به نخوردن مواد غذایی را رعایت کنید که معمولاً از 6 ساعت قبل از انجام آندوسکوپي باید کاملاً ناشتا باشید.
- از پزشک خود در مورد توقف یا ادامه ی داروهایی که مرتب مصرف می کنید , سوال کنید در صورتی که داروهای رقیق کننده ی خون مصرف می کنید این موضوع اهمیت بیشتری دارد.
- همراهی داشته باشید.

روش انجام آندوسکوپي

- یک راه وریدی جهت تزریق دارو برای شما تعبیه می شود.
- اسپری بی حس کننده موضعی در حلق شما زده می شود.
- جهت آرام کردن شما ممکن است از آرامبخش استفاده شود .
- شما به پهلوی چپ می خوابید.
- پزشک شما لوله ی آندوسکوپ را از دهان شما عبور می دهد و از طریق مری پایین می برد.
- پزشک از اسکوپ جهت بررسی ری و معده و دوازدهه شما استفاده میکند و نمونه نیز ممکن است گرفته شود.