



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان

بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده

داروهای بیماران دیالیزی

ویژه بیماران همودیالیز



واحد آموزش سلامت - بهار ۱۴۰۴

تاییدکننده: کارگروه بخش همودیالیز

کدسند: EH-MN/Pat Edu Pam/۰۰۰۰۱

منبع: پرستاری در بیماران دیالیز

شماره تماس: ۰۴۴۳۵۶۶۱۸۲۰ داخلی ۱۲۸۰

عوارض :

سر درد ، بی خوابی ، ضعف ، تهوع ، یبوست ، بی اشتها

نکات قابل توجه :

دارو را می توان همراه غذا یا معده خالی میل کرد
دارو در ظرف مقاوم به نور و جای خشک و خنک نگهداری کنید.

از شکستن ، خرد کردن و یا جویدن دارو خودداری کنید.

در مصرف غذاهای غنی از کلسیم فسفات و ویتامین دی مثل لبنیات احتیاط کنید.

جهت دریافت
فایل می توانید
بارکد را با تلفن
همراه خود اسکن
نمایید



رناژل (سولامر)

این دارو یک فسفر باندر (به فسفر مواد غذایی متصل می گردد) ترکیب یا باند شدن یا فسفر باعث دفع آن از طریق دستگاه گوارش می شود و مانع جذب فسفر می شود.

عوارض :

عوارض جانبی رناژل و کربنات کلسیم تقریباً شبیه هم بوده ولی در رناژل عوارض گوارشی مثل یبوست که یکی از مشکلات بیماران دیالیزی است کمتر دیده می شود.

نکات قابل توجه :

باید مصرف مواد خوراکی حاوی فسفر نظیر آجیل و لبنیات (ماست ، شیر ، دوغ ، کشک و ...) کاهش یابد.
در صورت مصرف رناژل هیچ گونه فسفات باندر دیگری نباید مصرف کنید.

فاصله مصرف رناژل با داروهای ضد تشنج ، وارفارین و سیپروفلوکساسین باید حداقل ۱-۳ ساعت باشد.

کلسی تریول :

این دارو در زمان کاهش سطح کلسیم خون استفاده می شود.

دوز دارو در بیماران دیالیزی بر اساس میزان کلسیم و فسفر خون تنظیم می شو . در صورت نیاز بعد از هر همودیالیز و یا روزانه تجویز می شود.

اپرکس (اریتروپویتین):

اکثر بیماران مبتلا به نارسایی کلیه که بمدت طولانی دچار اختلال عملکرد کلیه هستند، مبتلا به کم خونی هستند.

کم خونی به دلیل کاهش ترشح هورمون اریتروپویتین است که ۹۰ درصد آن در غده فوق کلیه ساخته و ترشح می شود وبا تاثیر بر مغز استخوان باعث افزایش تولید گلبول های قرمز خون می گردد. این دارو جهت جبران و اصلاح کم خونی ایجاد شده مورد استفاده می گیرد.

عوارض دارو:

مصرف بیش از اندازه اپرکس می تواند موجب از کار افتادگی فیستول گردد. بنابراین از تزریق خودسرانه و یا تغییر دوز آن اجتناب کنید. تزریق اپرکس باعث افزایش فشارخون شده که در نتیجه از تزریق آن در زمانی که فشار خون بالای ۱۶۰ میلی متر جیوه است باید خودداری شود.

نحوه مصرف اپرکس:

به دو صورت تزریق داخل وریدی و زیر جلدی قابل استفاده می باشد.

نکات قابل توجه هنگام مصرف اپرکس:

رنگ محلول باید شفاف باشد.

این دارو باید در درجه حرارت ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی آن جلوگیری شود. باید از مخلوط کردن آن با سایر داروها و رقیق کردن آن خودداری کرد.

دارو در یخچال نگهداری شود و از یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید محافظت شود.

ونوفر:

این دارو از ترکیبات آهن و ضد کم خونی می باشد.

عوارض داروی ونوفر:

افت فشارخون (در صورت تزریق سریع)، تغییر موقت حس چشایی، تهوع، ایجاد شوک و احساس طعم فلز در دهان می باشد.

نحوه مصرف ونوفر:

تزریق وریدی بهترین روش تزریق ونوفر می باشد که توصیه می شود هر میلی لیتر آن در ۲۰ میلی لیتر سرم نرمال سالین رقیق شود.

نکات قابل توجه:

- ✓ ونوفر نیازی به نگهداری در یخچال ندارد
- ✓ ونوفر با هیچ دارویی نباید مخلوط شود
- ✓ داروی رقیق نشده، داخل رگ سریع تزریق نشود.
- ✓ در زمان تجویز، قرص آهن قطع شود.

کربنات کلسیم:

این دارو به صورت مکمل غذایی هنگامی که دریافت کلسیم ممکن است ناکافی باشد مصرف می شود. همچنین در نارسایی کلیه به دلیل افزایش فسفر خون، این دارو استفاده می شود زیرا این دارو در دستگاه گوارش به فسفات متصل می شود و مانع جذب آن می گردد.

عوارض:

یبوست، تهوع، تشنگی و پرادرای از عوارض این دارو است.

نکات قابل توجه:

در صورت بروز علائمی نظیر بی اشتهایی، تکرار ادرار، خشکی دهان، گیجی، هزیان که نشان دهنده افزایش بیش از حد کلسیم در بدن است، باید سریعاً به پزشک خود مراجعه کنید.

اگر هدف از درمان اصلاح کلسیم است باید دارو را یک ساعت بعد از غذا و با یک لیوان پر از آب میل کنید.

اگر هدف اصلاح فسفر است باید دارو وسط غذا میل شود.

آنتی بیوتیک ها و آهن جذب خوراکی کلسیم را مختل می کنند، به همین دلیل با فاصله زمانی از هم مصرف شود.