



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان

بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده

نارسایی کلیه

ویژه بیماران همودیالیز

واحد آموزش سلامت - بهار ۱۴۰۴

تاییدکننده: کارگروه بخش همودیالیز

کد سند: EH-MN/Pat Edu Pam/۰۰۰۰۱

منبع: پرستاری در بیماران دیالیز


شماره تماس: ۰۴۴۳۵۶۶۱۸۲۰ داخلی ۱۲۸۰

پیوند کلیه

یکی دیگر از راههای درمان این بیماری پیوند کلیه است. با پیوند کلیه، کلیه فرد می تواند عملکرد طبیعی خودش را داشته باشد و نیازی به دیالیز شدن فرد بیمار نیست. پس از عمل پیوند، نیاز است که بیمار از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده کند تا کلیه او را پس نزنند. اگرچه این روش برای همه بیماران، گزینه مناسب به شمار نمی رود و چه بسا که گاهی عمل با موفقیت انجام نمی شود.

رژیم غذایی

در این روش پزشک رژیم غذایی خاصی به بیمار توصیه می کند. پزشک در این رژیم در مورد مصرف پروتئین و محدود کردن سدیم و پتاسیم به بیمار اطلاعاتی ارائه می کند.



جهت دریافت
فایل می توانید
بارکد را با تلفن
همراه خود اسکن
نمایید

درمان نارسایی کلیه

روش درمان نارسایی کلیه به علت ایجاد این بیماری بستگی دارد.

برای درمان این بیماری باید عامل بیماریهایی همچون دیابت و فشارخون برطرف شود.

شاید این بیماری در مراحل اول با دارو کنترل شود. روش های مختلفی که برای این منظور استفاده می شود که معروفترین روش های درمان آن عبارتند از :

دیالیز

دیالیز دو نوع اصلی دارد : ۱. دیالیز خونی ۲. دیالیز صفاقی در دیالیز خونی یا همودیالیز برای خارج کردن مواد زائد و آب اضافی از بدن به وسیله دستگاه همودیالیز از یک نوع فیلتر خاص استفاده می کنند.

در دیالیز صفاقی از مایعی که با لوله پلاستیکی در حفره شکم بیمار قرار داده می شود، مواد زائد و آب اضافی از بدن خارج می شود.

نارسایی کلیه

نارسایی کلیه به معنی کاهش شدید عملکرد کلیه است.
نارسایی کلیه دو نوع دارد: حاد و مزمن

نارسایی حاد کلیه:

با آسیب حاد کلیوی، به سرعت پیشرفت می کند که معمولا در کمتر از چند روز این اتفاق می افتد.
نارسایی حاد کلیه در بیماران بستری به ویژه افراد به شدت بیمار که نیازمند مراقبت ویژه هستند، شایع است.
نارسایی حاد کلیوی می تواند کشنده باشد و نیازمند درمان جدی است. با این وجود نارسایی حاد کلیوی می تواند برگشت پذیر باشد.

نارسایی مزمن کلیه:

مهمترین علامت در این نوع نارسایی خاموش بودن آن است. افراد مبتلا به نارسایی مزمن کلیه ممکن است از سال ها پیش دچار این بیماری باشند، اما چون علامت خاصی ندارد یا روند بروز علائم کند است به طور آرام و پنهانی بافت کلیه را از دست می دهند.
از جمله مهمترین علل نارسایی مزمن کلیه بیماری دیابت، فشار خون، کلیه پلی کیستیک، عفونت های مکرر کلیه و انسداد مجاری ادراری است.

علائم نارسایی کلیه

بی شک نارسایی کلیه نشانه هایی دارد که یکی از آنها می تواند مشکلات ادراری باشد. چون در حالت عادی سموم و مواد زائد بدن با ادرار دفع می شوند و اگر دفع ادرار با مشکل همراه باشد سموم در بدن جمع شده و به این ترتیب نارسایی کلیه اتفاق می افتد.

به طور کلی از علائم نارسایی کلیه می توان به موارد زیر اشاره کرد که عبارتند از:

- یکی از علائم نارسایی کلیه کاهش پیدا کردن میزان دفع ادرار است. چون ادرار دفع نمی شود مایع در بدن جمع می شود و به اصطلاح با احتباس همراه شده و اندام های تحتانی، پاها و زانوها متورم می شوند.
- یکی دیگر از علائم نارسایی کلیه این است که زیر چشمها پف می کند. خستگی و ضعف از علائم دیگری است که باید به آن توجه شود
- گیجی، حالت تهوع و احساس تنگی نفس
- درد قفسه سینه و نامنظم شدن ضربان قلب
- کاهش هوشیاری
- خارش مداوم
- کرامپ و انقباض عضلانی
- تشنج
- در مواردیکه نارسایی کلیه شدید باشد، ممکن است فرد به حالت کما برود و حتی گاهی به مرگ فرد منجر شود.

روشهای تشخیص نارسایی کلیه: پزشک با توجه به

علایمی که در فرد می بیند و تستهای تشخیصی زیر می تواند نارسایی کلیه را تشخیص دهد.

آزمایش ادرار: پزشک با استفاده از این آزمایش می تواند از هرگونه ناهنجاری که در دفع پروتئین بیمار ممکن است وجود داشته باشد اطلاع پیدا کند.

اندازه گیری حجم ادرار: در این آزمایش حجم ادرار بیمار اندازه گیری می شود. اگر مقدار ادرار کم باشد، نشان دهنده مسدود بودن مجاری ادراری بیمار است که حکایت بر بیماری کلیوی او دارد.

تصویر برداری: سونوگرافس، ام آر آی و تصویر سی تی اسکن از مجاری ادراری می تواند هرگونه انسداد یا ناهنجاری در کلیه فرد را به نمایش بگذارد.

نمونه گیری خون: نمونه خون را برای اندازه گیری اوره و کراتینین تست می کنند و طبق نتیجه این آزمایش اگر میزان اوره و کراتینین زیاد باشد می تواند نشان دهد که در کلیه فرد نارسایی وجود دارد.