

## بعد انجام آندوسکوپی

- به علت دریافت آرامبخش تا ۲۴ ساعت رانندگی نکنید.

تا زمانی که اثر داروهایی که دریافت کرده اید ، فشار خون ، ضربان قلب ، تنفس و سطح اکسیژن خون شما بررسی می شود.

- زمانی که بی حسی گلوی شما تمام می شود می توانید چیزی بخورید.

از پرستار بخش و پزشک معالج در مورد این که چه زمانی جواب نمونه آماده است ، سوال بپرسید. پیگیری نمونه ی پاتولوژی را در تاریخ مشخص شده انجام دهید.

## شما نیاز به مراقبت پزشکی دارید اگر:

- گلو درد بیش از یک روز طول بکشد.
- بلع مشکل داشتید.

## شما نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارید در صورتی که علایم زیر را داشته باشید:

- بروز تب
- استفراغ خونی یا استفراغی که به نظر ت می رسد
- قهوه ای باشد.

- مدفوع خونی سیاه رنگ یا قیری رنگ
- گلو درد شدید یا نداشتن توان بلع غذا
- تنفس سخت



# دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذغان

بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقدة

## آندوسکوپی

ویژه بیماران و همراهان




واحد آموزش سلامت

بهار

تاییدکننده: کارگروه آموزش به بیمار بخش داخلی

و واحد آندوسکوپی

کدسنند: EH-MN/Pat Edu Pam/۰۰۰۷



جهت دریافت  
فایل می توانید  
بارکد را با تلفن  
همراه خود اسکن  
نمایید

## آمادگی قبل از انجام آندوسکوپی

- دستور پزشک مربوط به نخوردن مواد غذایی را رعایت کنید که معمولاً از ۶ ساعت قبل از انجام آندوسکوپی باید کاملاً ناشتا باشید.
- از پزشک خود در مورد توقف یا ادامهٔ داروهایی که مرتب مصرف می‌کنید، سوال کنید در صورتی که داروهای رقیق کنندهٔ خون مصرف می‌کنید این موضوع اهمیت بیشتری دارد.
- همراهی داشته باشید.

## روش انجام آندوسکوپی

- یک راه وریدی جهت تزریق دارو برای شما تعییه می‌شود.
- اسپری بی‌حس کنندهٔ موضعی در حلق شما زده می‌شود.
- جهت آرام کردن شما ممکن است از آرامبخش استفاده شود.
- شما به پهلوی چپ می‌خوابید.
- پزشک شما لولهٔ آندوسکوپ را از دهان شما عبور می‌دهد و از طریق مری پایین می‌برد.
- پزشک از اسکوپ جهت بررسی ری و معده و دوازده‌مازو استفاده می‌کند و نمونه نیز ممکن است گرفته شود.

پزشک ممکن است جهت تشخیص سرطان بخش فوقانی دستگاه گوارش و همچنین جهت پیدا کردن علت مشکلات دیگر مانند:

### • درد معده

### • سوزش سر دل

### • درد یا مشکل هنگام بلع

### • تهوع و استفراغ

### • خونریزی از معده

### • زخم معده

آندوسکوپی را انجام دهد.

## قبل از انجام آندوسکوپی شما باید موارد زیر را

### بدانید و اطلاع دهید:

هرگونه آلرژی با حساسیت به داروی خاص

هرگونه دارویی که مصرف می‌کنید:

شامل ویتامین‌ها، قطره‌های چشمی و یا هر دارویی که

بدون نسخهٔ پزشک استفاده می‌کنید و یا مصرف

اسپرین یا وارفارین

هرگونه اختلال خونی که دارید.

هرگونه جراحی قبلی که داشتید.

هر مشکل پزشکی قبلی

بارداری

## آندوسکوپی فوقانی آندوسکوپی فوقانی:

روشی است که از آن جهت مشاهده بخش فوقانی دستگاه گوارش استفاده می‌شود.

در این روش پزشک شما یک لولهٔ باریک و قابل انعطاف را از دهانتان عبور می‌دهد و از مری به معده داخل می‌شود.

یک دوربین کوچک به انتهای لولهٔ چسبیده است عکس‌ها با دوربین بر روی مانیتوری که در داخل اتاق آندوسکوپی نصب شده است نمایش داده می‌شود.

در طی انجام آندوسکوپی، پزشک ممکن است تکه‌هایی از بافت را جهت فرستادن به آزمایشگاه و بررسی میگروسوکوپی بافت شما نمونه بردار و در ظرف مخصوص جهت ارسال به پاتولوژی قرار دهد.

## خطرات و عوارض آندوسکوپی چیست؟

به طور کلی این روش بی‌خطر می‌باشد با این حال مشکلاتی ممکن است رخداد:

❖ واکنش حساسیتی به داروها

❖ سوراخ یا پارگی در مری، معده یا روده

❖ عفونت

❖ خونریزی