



دانشگاه علوم پزشکی رضایت بهداشتی اهلی آرخ

بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده

عفونت خون نوزادی

ویژه والدین



واحد آموزش سلامت - بهار ۱۴۰۴

تاییدکننده: کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر

کدسند: EH-MN/Pat Edu Pam/۰۰۰۰۱

منبع: آموزشهای دوران بارداری و آمادگی برای زایمان معاونت بهداشت

شماره تماس: ۰۴۴۳۵۶۶۱۸۲۰ داخلی ۱۲۸۱

- مهمترین عامل کنترل عفونت شستشوی مرتب دست به روش صحیح می باشد پس قبل وبعد از تماس با نوزاد خود دستهای خود را بشویید .
- یکی از عوامل مهم دفاعی در برابر عفونت های دوران نوزادی تغذیه با شیرمادر است مرتب به نوزاد خود شیر بدهید.
- در صورت تجویز آنتی بیوتیک در منزل آن را سر ساعت به نوزاد خود بدهید و خودسرانه آن را قطع ننمایید.
- در فواصل منظم و مشخص جهت پیگیری درمان به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت مشاهده علائم جدید و غیرقابل توجیه در طول درمان به پزشک مراجعه نمایید.

جهت دریافت
فایل می توانید
بارکد را با تلفن
همراه خود اسکن
نمایید



مراقبت در زمان بستری :

- نوزاد شما باید در بخش مراقبت های ویژه بستری شود.
- طی مدتی که نوزاد شما در بخش مراقبت های ویژه بستری است ارتباط عاطفی خود را با او قطع نکنید.
- از دستکاری سرم ها و روابط های متصل به نوزاد خود را خودداری نمایید.
- با تیم مراقبتی در زمان اقدامات تشخیصی و درمانی همکاری نمایید.
- داروها را طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار برای نوزاد شما اجرا خواهد شد.
- در صورت اجازه پزشک می توانید شیردهی نوزاد خود را شروع نمایید.
- مواظب باشید در زمان شیردهی با بغل کردن نوزاد آنژیوکت یا لوله سرم از دست نوزاد شما خارج نشود.
- ممکن است روزانه از نوزاد شما خونگیری شود.

مادر گرامی

لطفا در دوره بستری بودن نوزاد خود مرتب دستهای خود را بشویید تا در انتقال عفونت جلوگیری شود.

عفونت خونی (سپسیس نوزادی) چیست ؟

یک بیماری جدی به حساب می آید که سیستم دفاعی بدن نوزاد توسط مواد سمی که از باکتری ها ، ویروس ها و... آزاد می شود مورد تهاجم و حمله قرار می گیرد.

علل عفونت خونی در نوزاد چیست ؟

- عفونت های مادر طی بارداری
- زایمان زود رس
- پارگی زودرس کیسه آب که بیش از ۲۴ ساعت طول کشیده باشد.
- زایمان طولانی و مشکل

عفونت نوزادی به اشکال زیر نمایان می شود:

- **عفونت زودرس** : از بدو تولد تا روز هشتم بروز می کند که بیشتر نوزادان نارس مبتلا می شوند.
- **عفونت دیررس** : از روز هشتم تولد تا ۲۸ روزگی که معمولا در نوزادان سر موعد دیده می شود.
- **عفونت بیمارستانی** : در نوزادان نارس بستری در بخش میزان ابتلا بیشتر می شود.

عوامل زمینه ساز عفونت بیمارستانی :

- بستری طولانی مدت در بیمارستان
- تزریقات داخل رگ بمدت طولانی
- تجهیزات آلوده بیمارستانی

علائم عفونت خون :

نشانه های تنفسی :

تنفس تند ، تورفتگی قفسه سینه و در موارد شدید قطع تنفس.

ناپایداری درجه حرارت :

کاهش یا افزایش دمای بدن نسبت به دمای طبیعی

نشانه های گوارشی :

عدم تحمل تغذیه و شیر ، نفخ شکم

نشانه های عصبی :

خواب آلودگی و بی حالی ، عضلات شل ، در بعضی موارد لرز و حتی تشنج دیده می شود.

تغییر ضربان قلب :

خیلی بیشتر از حر طبیعی و یا خیلی کندتر از حد طبیعی است.

تغییر رنگ پوست :

پوست رنگ پریده یا کبود یا زردی پوست

روش های تشخیصی :

آزمایشات خون و تهیه کشت خون

کشیدن مایع مغزی نخاعی

جمع آوری ادرار و کشت ادرار

گرفتن عکس از ریه نوزاد تا از نظر عفونت ریه بررسی شود.

در صورت مثبت شدن کشتها درمان باید ۱۰-۷ روز ادامه

یابد و در صورت منفی شدن کشت وعدم بروز نشانه ها در

نوزاد درمان طی ۳ روز قطع می گردد.

کنترل نوزاد :

به محض شک به عفونت در نوزاد باید بستری و درمان با

آنتی بیوتیک شروع شود زیرا به تاخیر انداختن شروع

درمان می تواند عواقب جبران ناپذیری در نوزاد به جای

گذارد.

نوزاد مبتلا به سپسیس ۱۰ تا ۱۴ روز حداقل در بیمارستان

بستری می شود.

اگر مننژیت هم به دنبال سپسیس نوزاد را درگیر کرده

باشد درمان ممکن است تا ۲۱ روز ادامه پیدا کند.

